

CONVOCATÒRIA:

MODEL 2025

CONVOCATORIA:

MODELO 2025

ASSIGNATURA: Química

ASIGNATURA: Química

BAREM DE L'EXAMEN: L'examen consta de 5 exercicis. Cada exercici té una puntuació màxima de 2 punts. Es permet l'ús de calculadores sempre que no siguin gràfiques o programables i que no puguen realitzar càlcul simbòlic ni emmagatzemar text o fòrmules en memòria.

1 1 H Hidrógeno 1,008	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 2 He Helio 4,0026
3 Li Litio 6,94	4 Be Beril·li 9,0122																
11 Na Sodio 22,990	12 Mg Magnesio 24,305																
19 K Potasio 39,098	20 Ca Calcio 40,078	21 Sc Escandio 44,956	22 Ti Titanio 47,867	23 V Vanadio 50,942	24 Cr Cromo 51,996	25 Mn Manganeso 54,938	26 Fe Hierro 55,845	27 Co Cobalto 58,933	28 Ni Níquel 58,693	29 Cu Cobre 63,546	30 Zn Zinc 65,38	31 Ga Galió 69,723	32 Ge Germanio 72,630	33 As Arsènic 74,922	34 Se Seleni 78,971	35 Br Bromo 79,904	36 Kr Kryptón 83,798
37 Rb Rubidi 85,468	38 Sr Estronci 87,62	39 Y Itrio 88,906	40 Zr Circonio 91,224	41 Nb Niobio 92,906	42 Mo Molibdено 95,95	43 Tc Tecnecio [97]	44 Ru Ruteni 101,07	45 Rh Rodio 102,91	46 Pd Paladi 106,42	47 Ag Plata 107,87	48 Cd Cadmio 112,41	49 In Indio 114,82	50 Sn Estani 118,71	51 Sb Antimoni 121,76	52 Te Teluri 127,60	53 I Yodo 126,90	54 Xe Xenò 131,29
55 Cs Cesio 132,91	56 Ba Bario 137,33	72 Hf Hafnio 178,49	73 Ta Tàntalo 180,95	74 W Wolframio 183,84	75 Re Renio 186,21	76 Os Osmio 190,23	77 Ir Iròni 192,22	78 Pt Platino 195,08	79 Au Oro 196,97	80 Hg Mercuri 200,59	81 Tl Talio 204,38	82 Pb Piom 207,2	83 Bi Bismut 208,98	84 Po Polonio [209]	85 At Astato [210]	86 Rn Radó [222]	
87 Fr Francio [223]	88 Ra Radio [226]	104 Rf Rutherford [267]	105 Db Dubniov [268]	106 Sg Seaborgi [270]	107 Bh Bohri [269]	108 Hs Hasio [277]	109 Mt Meitneri [281]	110 Ds Damstadi [282]	111 Rg Roentgeni [285]	112 Cn Copemicio [286]	113 Nh Nihonio [288]	114 Fl Flerovio [290]	115 Mc Moscovio [293]	116 Lv Livermorio [294]	117 Ts Teneso [295]	118 Og Oganesson [294]	
57 La Lantano 138,91	58 Ce Cerio 140,12	59 Pr Praseodimi 140,91	60 Nd Neodimi 144,24	61 Pm Prometio [145]	62 Sm Samario 150,36	63 Eu Europi 151,96	64 Gd Gadolini 157,25	65 Tb Terbio 158,93	66 Dy Disprosi 162,50	67 Ho Holmi 164,93	68 Er Erbio 167,26	69 Tm Tulio 168,93	70 Yb Iterbio 173,05	71 Lu Lutecio 174,97			
89 Ac Actinio [227]	90 Th Torio 232,04	91 Pa Protactini 231,04	92 U Urani 238,03	93 Np Neptuni [237]	94 Pu Plutoni [244]	95 Am Americi [243]	96 Cm Curio [247]	97 Bk Berkeli [247]	98 Cf Californi [251]	99 Es Einsteni [252]	100 Fm Fermi [257]	101 Md Mendeltevi [258]	102 No Nobelio [259]	103 Lr Lawrenci [262]			

Constants i factors de conversió: $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$;

$c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$; K_w (298 K) = 10^{-14} .

1 atm = 1,013 bar = 760 mmHg = 1,013 · 10⁵ Pa; 1 J = 0,24 cal.

FÓRMULES

Equació d'estat dels gasos ideals: $PV = nRT$	Equació d'Arrhenius: $k = Ae^{-E_a/RT}$	Energia d'un fotó: $E = \frac{hc}{\lambda}$
Equació de Dalton: $p_i = x_i P$	2 ^a llei de Faraday: $m(g) = \frac{M(g \cdot \text{mol}^{-1}) \cdot Q(C)}{n_e \cdot F(C \cdot \text{mol}^{-1})}$	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$

Exercici 1. (2 punts) L'amoníac és una de les bases febles més àmpliament utilitzades. Una de les seues principals aplicacions és la producció de fertilitzants, especialment el nitrat d'amoni i la urea, que són crucials per a l'agricultura moderna. A més, s'utilitza com a refrigerant en sistemes de refrigeració industrials, en la manufactura d'explosius, productes de neteja, tèxtils, plàstics i productes farmacèutics. La seua constant de dissociació bàsica és $K_b = 1,8 \cdot 10^{-5}$.

En el laboratori es prepara un litre de dissolució amoniaca dissolvent 0,15 mol de NH₃(g) en aigua.

1.1 Escriga l'equació que descriu l'equilibri de dissociació bàsic de l'amoníac i calcule tant la concentració d'ions OH⁻(aq) en equilibri com el pH de la dissolució. **(1 punt)**

1.2 Calcule el percentatge de molècules de NH₃ que han reaccionat. **(0,5 punts)**

1.3 Raone si la següent afirmació és vertadera o falsa: "L'amoníac és una base feble, per tant, el seu àcid conjugat és un àcid fort". **(0,5 punts)**

Exercici 2. (2 punts) Considera les següents molècules: BF_3 , CF_4 i PF_3 . Responga a les següents qüestions:

2.1 Escrige la configuració electrònica d'estat fonamental del B i del P. **(0,5 punts)**

2.2 Deduïsca la geometria de les molècules BF_3 , CF_4 i PF_3 i justifique quina d'elles presenta un angle d'enllaç F-X-F major. **(1 punt)**

Contesta a un dels següents apartats:

2.3.1 Escrige tots els possibles valors dels números quàntics per a un electró $2p$ i per a un electró $3s$. **(0,5 punts)**

2.3.2 Discutisca la polaritat de les molècules CF_4 i PF_3 . **(0,5 punts)**

Exercici 3. (2 punts) El fosfat de plata és una sal poc soluble en aigua que s'utilitza per a la millora de l'eficiència de cèl·lules solars fotovoltaiques. El producte de solubilitat del fosfat de plata, $\text{Ag}_3\text{PO}_4(s)$, és K_{ps} (25°C) = $2,8 \cdot 10^{-18}$. Contesta a les següents qüestions:

3.1 Escrige la reacció de dissolució i l'expressió del producte de solubilitat per al Ag_3PO_4 . **(0,5 punts)**


3.2 Calcule la solubilitat, en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, del Ag_3PO_4 en aigua a 25°C . **(1 punt)**

Contesta a un dels següents apartats:

3.3.1 Un estudiant realitza un experiment en el laboratori i obté que la solubilitat en aigua del Ag_3PO_4 és $6,5 \cdot 10^{-3} \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$. Raone si aquest valor és consistent amb el resultat obtingut en l'apartat anterior. **(0,5 punts)**

3.3.2 Raone què li ocorrerà a la solubilitat del fosfat de plata si, a una dissolució saturada, li afegim una xicoteta quantitat de la sal soluble nitrat de plata. **(0,5 punts)**

Exercici 4. (2 punts) En determinats dispositius pirotècnics s'utilitza una mescla d'alumini en pols, $\text{Al}(s)$, i perclorat d'amoni, $\text{NH}_4\text{ClO}_4(s)$. La mescla reacciona d'acord amb la següent equació química:



4.1 Calcule la variació d'entalpia estàndard del procés, expressada en kJ per mol d'alumini. **(0,75 punts)**

4.2 Quants grams d' Al i NH_4ClO_4 es necessiten perquè la seu reacció allibere 2000 kJ d'energia. Calcule el percentatge en massa de cada compost en la mescla. **(0,75 punts)**

Contesta a un dels següents apartats:

4.3.1 La reacció descrita en l'equació química anterior, és una reacció red-ox? Justifique-ho. **(0,5 punts)**

4.3.2 Quin tipus de sòlid és el perclorat d'amoni? Indique dues característiques d'aquesta mena de sòlid. **(0,5 punts)**

Dades: variació d'entalpia de formació estàndard, ΔH_f° ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$): $\text{Al}_2\text{O}_3(s) = -1668,8$; $\text{NH}_4\text{ClO}_4(s) = -294,1$; $\text{AlCl}_3(s) = -704,2$; $\text{NO}(g) = +90,3$; $\text{H}_2\text{O}(g) = -241,8$.

Exercici 5. (2 punts)

5.1 Anomene i formule els compostos **A** i **B**. Indique el tipus de reacció en cada cas. **(1 punt)**

5.1.1	A	$\xrightarrow{\text{KMnO}_4, \text{ calor}}$	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-CH}_2\text{-CH}_3$
5.1.2	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-CH}_3$	$\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4, \text{ calor}}$	B + H_2O

Contesta a un dels següents apartats:

5.2.1 Dibuixa la fórmula estructural d'un isòmer de la molècula **A**. Indique el/els grups funcionals que conté la molècula dibuixada. **(1 punt)**

5.2.2 En una reacció d'esterificació entre àcid acètic (o etanoic) i etanol s'observen les següents dades: concentració inicial d'àcid acètic = $0,8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; concentració inicial d'etanol = $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; constant de velocitat de reacció, $k = \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. Sabent que l'ordre de reacció respecte de l'àcid acètic és 1 i que l'ordre de reacció respecte de l'etanol és 1, escrige la reacció d'esterificació i calcule la velocitat inicial de la reacció. **(1 punt)**

CONVOCATÒRIA:

MODEL 2025

CONVOCATORIA:

MODELO 2025

ASSIGNATURA: Química

ASIGNATURA: Química

BAREMO DEL EXAMEN: El examen consta de 5 ejercicios. Cada ejercicio tiene una puntuación máxima de 2 puntos. Se permite el uso de calculadoras siempre que no sean gráficas o programables y que no puedan realizar cálculo simbólico ni almacenar texto o fórmulas en memoria.

1 1 H Hidrógeno 1,008	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 2 He Helio 4,0026
3 Li Litio 6,94	4 Be Berilio 9,0122																
11 Na Sodio 22,990	12 Mg Magnesio 24,305																
19 K Potasio 39,098	20 Ca Calcio 40,078	21 Sc Escandio 44,956	22 Ti Titanio 47,867	23 V Vanadio 50,942	24 Cr Cromo 51,996	25 Mn Manganeso 54,938	26 Fe Hierro 55,845	27 Co Cobalto 58,933	28 Ni Níquel 58,693	29 Cu Cobre 63,546	30 Zn Zinc 65,38	31 Ga Gálio 69,723	32 Ge Germanio 72,630	33 As Arsénico 74,922	34 Se Selenio 78,971	35 Br Bromo 79,904	36 Kr Kriptón 83,798
37 Rb Rubidio 85,468	38 Sr Estroncio 87,62	39 Y Itrio 88,906	40 Zr Circonio 91,224	41 Nb Niobio 92,906	42 Mo Molibdeno 95,95	43 Tc Tecnetio [97]	44 Ru Rutenio 101,07	45 Rh Rodio 102,91	46 Pd Paladio 106,42	47 Ag Plata 107,87	48 Cd Cadmio 112,41	49 In Indio 114,82	50 Sn Estanho 118,71	51 Sb Antimonio 121,76	52 Te Telurio 127,60	53 I Yodo 126,90	54 Xe Xenón 131,29
55 Cs Cesio 132,91	56 Ba Bario 137,33	72 Hf Hafnio 178,49	73 Ta Tántalo 180,95	74 W Wolframio 183,84	75 Re Renio 186,21	76 Os Osmio 190,23	77 Ir Irídio 192,22	78 Pt Platino 195,08	79 Au Oro 196,97	80 Hg Mercurio 200,59	81 Tl Talio 204,38	82 Pb Plomo 207,2	83 Bi Bismuto 208,98	84 Po Polonio [209]	85 At Astato [210]	86 Rn Radón [222]	
87 Fr Francio [223]	88 Ra Radio [226]	104 Rf Rutherfordio [267]	105 Db Dubnio [268]	106 Sg Seaborgio [270]	107 Bh Bohrio [269]	108 Hs Hasio [277]	109 Mt Meitnerio [277]	110 Ds Damstadio [281]	111 Rg Roentgenio [282]	112 Cn Copernicio [285]	113 Nh Nihonio [286]	114 Fl Flerovio [290]	115 Mc Moscovio [293]	116 Lv Livermorio [294]	117 Ts Tenesio [294]	118 Og Oganesson [294]	
57 La Lantano 138,91	58 Ce Cerio 140,12	59 Pr Praseodimio 140,91	60 Nd Neodimio 144,24	61 Pm Prometio [145]	62 Sm Samario 150,36	63 Eu Europio 151,96	64 Gd Gadolino 157,25	65 Tb Terbio 158,93	66 Dy Disprosio 162,50	67 Ho Holmio 164,93	68 Er Erbio 167,26	69 Tm Tulio 168,93	70 Yb Iterbio 173,05	71 Lu Lutecio 174,97			
89 Ac Actinio [227]	90 Th Torio 232,04	91 Pa Protactinio 231,04	92 U Urano 238,03	93 Np Neptunio [237]	94 Pu Plutonio [244]	95 Am Americio [243]	96 Cm Curio [247]	97 Bk Berkeleio [247]	98 Cf Californio [251]	99 Es Einstenio [252]	100 Fm Fermio [257]	101 Md Mendelevio [258]	102 No Nobelio [259]	103 Lr Lawencio [262]			

Constantes y factores de conversión: $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$;

$c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$; K_w (298 K) = 10^{-14} .

1 atm = 1,013 bar = 760 mmHg = $1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; 1 J = 0,24 cal.

FÓRMULAS

Ecuación de estado de los gases ideales: $PV = nRT$

Ecuación de Arrhenius: $k = Ae^{-E_a/RT}$

Energía de un fotón: $E = \frac{hc}{\lambda}$

Ecuación de Dalton: $p_i = x_i P$

2ª ley de Faraday: $m(g) = \frac{M(g \cdot \text{mol}^{-1}) \cdot Q(C)}{n_e \cdot F(C \cdot \text{mol}^{-1})}$

$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$

Ejercicio 1. (2 puntos) El amoníaco es una de las bases débiles más ampliamente utilizadas. Una de sus principales aplicaciones es la producción de fertilizantes, especialmente el nitrato de amonio y la urea, que son cruciales para la agricultura moderna. Además, se utiliza como refrigerante en sistemas de refrigeración industriales, en la manufactura de explosivos, productos de limpieza, textiles, plásticos y productos farmacéuticos. Su constante de disociación básica es $K_b = 1,8 \cdot 10^{-5}$.

En el laboratorio se prepara un litro de disolución amoniaca disolviendo 0,15 mol de NH₃(g) en agua.

1.1 Escriba la ecuación que describe el equilibrio de disociación básico del amoníaco y calcule tanto la concentración de iones OH⁻(ac) en equilibrio como el pH de la disolución. **(1 punto)**

1.2 Calcule el porcentaje de moléculas de NH₃ que han reaccionado. **(0,5 puntos)**

1.3 Razona si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: "El amoníaco es una base débil, por lo tanto, su ácido conjugado es un ácido fuerte". **(0,5 puntos)**

Ejercicio 2. (2 puntos) Considere las siguientes moléculas: BF_3 , CF_4 y PF_3 . Responda a las siguientes cuestiones:

2.1 Escriba la configuración electrónica de estado fundamental del B y del P. **(0,5 puntos)**

2.2 Deduzca la geometría de las moléculas BF_3 , CF_4 y PF_3 y justifique cuál de ellas presenta un ángulo de enlace F-X-F mayor. **(1 punto)**

Conteste a uno de los siguientes apartados:

2.3.1 Escriba todos los posibles valores de los números cuánticos para un electrón 2p y para un electrón 3s. **(0,5 puntos)**

2.3.2 Discuta la polaridad de las moléculas CF_4 y PF_3 . **(0,5 puntos)**

Ejercicio 3. (2 puntos) El fosfato de plata es una sal poco soluble en agua que se utiliza para la mejora de la eficiencia de células solares fotovoltaicas. El producto de solubilidad del fosfato de plata, $\text{Ag}_3\text{PO}_4(s)$, es K_{ps} (25°C) = $2,8 \cdot 10^{-18}$. Conteste a las siguientes cuestiones:

3.1 Escriba la reacción de disolución y la expresión del producto de solubilidad para el Ag_3PO_4 . **(0,5 puntos)**


3.2 Calcule la solubilidad, en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, del Ag_3PO_4 en agua a 25°C . **(1 punto)**

Conteste a uno de los siguientes apartados:

3.3.1 Un estudiante realiza un experimento en el laboratorio y obtiene que la solubilidad en agua del Ag_3PO_4 es $6,5 \cdot 10^{-3} \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$. Razone si este valor es consistente con el resultado obtenido en el apartado anterior. **(0,5 puntos)**

3.3.2 Razone qué le ocurrirá a la solubilidad del fosfato de plata si, a una disolución saturada, le añadimos una pequeña cantidad de la sal soluble nitrato de plata. **(0,5 puntos)**

Ejercicio 4. (2 puntos) En determinados dispositivos pirotécnicos se utiliza una mezcla de aluminio en polvo, $\text{Al}(s)$, y perclorato de amonio, $\text{NH}_4\text{ClO}_4(s)$. La mezcla reacciona de acuerdo con la siguiente ecuación química:



4.1 Calcule la variación de entalpía estándar del proceso, expresada en kJ por mol de aluminio. **(0,75 puntos)**

4.2 ¿Cuántos gramos de Al y NH_4ClO_4 se necesitan para que su reacción libere 2000 kJ de energía? Calcule el porcentaje en masa de cada compuesto en la mezcla. **(0,75 puntos)**

Conteste a uno de los siguientes apartados:

4.3.1 La reacción descrita en la ecuación química anterior, ¿es una reacción red-ox? Justifíquelo. **(0,5 puntos)**

4.3.2 ¿Qué tipo de sólido es el perclorato de amonio? Indique dos características de este tipo de sólido. **(0,5 puntos)**

Datos: variación de entalpía de formación estándar, ΔH_f^0 ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$): $\text{Al}_2\text{O}_3(s) = -1668,8$; $\text{NH}_4\text{ClO}_4(s) = -294,1$; $\text{AlCl}_3(s) = -704,2$; $\text{NO}(g) = +90,3$; $\text{H}_2\text{O}(g) = -241,8$.

Ejercicio 5. (2 puntos)

5.1 Nombre y formule los compuestos **A** y **B**. Indique el tipo de reacción en cada caso. **(1 punto)**

5.1.1	A	$\xrightarrow{\text{KMnO}_4, \text{ calor}}$	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-CH}_2\text{-CH}_3$
5.1.2	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-CH}_3$	$\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4, \text{ calor}}$	B + H_2O

Conteste a uno de los siguientes apartados:

5.2.1 Dibuje la fórmula estructural de un isómero de la molécula A. Indique el/los grupos funcionales que contiene la molécula dibujada. **(1 punto)**

5.2.2 En una reacción de esterificación entre ácido acético (o etanoico) y etanol se observan los siguientes datos: concentración inicial de ácido acético = $0,8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; concentración inicial de etanol = $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; constante de velocidad de reacción, $k = 0,05 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. Sabiendo que el orden de reacción respecto del ácido acético es 1 y que el orden de reacción respecto del etanol es 1, escriba la reacción de esterificación y calcule la velocidad inicial de la reacción. **(1 punto)**